

Hauptsitz: UP Medi-Europa SA, Schweiz. Herkunftsländ: Hergestellt in der EU. Vertreter: Medis GmbH, Campus 21, Europaring, A-2345 Brunn am Gebirge / Sedež podjetja: UP Medi-Europa SA, Švica. Država porekla: Proizvedeno v EU. Distributer: Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana

Novalac 3 Milchpulver für Kleinkinder ist für Kinder von 1 bis 3 Jahren geeignet. Ein fertiges Fläschchen Novalac 3 enthält Kalzium und Vitamin D (beides wird für ein gesundes Wachstum und eine gesunde Entwicklung der Knochen bei Kindern benötigt), Eisen (notwendig für die normale Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten von Kindern) und Jod (für ein normales Wachstum nötig). Novalac 3 enthält weiters Vitamin A, B1, B2, C, D und Biotin und ist reich an Vitamin B12 und K1. Novalac 3 eignet sich nach dem Gebrauch von Novalac 2 oder einer anderen Folgemilchnahrung. Es hat einen angenehmen Vanillegeschmack. / Novalac 3 za otroke od 1. do 3. leta starosti. Pripravljen obrok (ena steklenička mleka Novalac 3) vsebuje kalcij in vitamin D (potrebna za normalno rast in razvoj kosti otrok), železo (prispeva h kognitivnemu razvoju otrok) in jod (prispeva k rasti otrok). Novalac 3 je vir vitaminov A, B1, B2, C, D in biotina ter je bogat z vitamini B12 in K1. Novalac 3 je primeren kot nadaljevalna hrana po uporabi Novalaca 2 ali kateregakoli drugega nadaljevalnega mleka. Ima dober vaniljev okus.

Dosierung/Odmerjanje

Ihr Kind sollte täglich ausreichend warme (<37 °C) oder kalte Novalac 3 Milchpulver-Nahrung trinken, die auch zur Zubereitung von Getreidebreien und anderen Mahlzeiten, als Teil einer ausgewogenen Ernährung, verwendet werden kann. Eine Dose mit 400 g reicht für 11 Mahlzeiten. Ein gestrichener Messlöffel der beigelegt ist, enthält 4,5 g Novalac. Zubereitung in der Flasche: pro: 30 ml Wasser einen Messlöffel Novalac 3 hinzufügen. Zubereitung im Trinkbecher: pro: 240 ml Wasser 8 Messlöffel Novalac 3 hinzufügen. / Vašemu otroku lahko date tople (<37 °C) ali hladne napitke Novalac 3, ki se lahko uporablja tudi za pripravo žitnih kašic in ostalih obrokov kot del uravnotežene prehrane. Ena pločevinka s 400 g zadostuje za pripravo 11 obrokov. Do vrha napolnjena in do roba poravnana priložena merica vsebuje 4,5 g praška. Priprava v steklenički: Za vsakih 30 ml vode dodajte eno merico Novalaca 3. Priprava v skodelici: V 240 ml vode dodajte 8 meric Novalaca 3.

Immer eine frische Mahlzeit zubereiten. • Vor Wärme und Licht schützen, an einem trockenen Ort aufbewahren. • Mindestens haltbar bis: siehe Boden. • Nach Öffnen der Dose Inhalt innerhalb von 3 Wochen verbrauchen. • Dose nach Gebrauch gut verschließen. • Reste der Mahlzeit nicht aufbewahren, sondern entsorgen. / Vedno pripravite svež obrok. • Hranite na suhem mestu, zaščiten pred toploto in svetlobo. Uporabno najmanj do: glejte dno pločevinke. • Po prvem odprtju pločevinke, morate vsebino porabiti v treh tednih. • Po vsaki uporabi pločevinko dobro zaprite. • Ne shranjujte nepopitega obroka. Ostanek zavrzite.

1514M19J 30149889



3 831061 011707

Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Pakirano v kontrolirani atmosferi.

www.novalac.at
www.novalac.si



Novalac

3

Milchpulver für Kleinkinder
Prah za pripravo mlečnega
napitka za majhne otroke



400 g e

Novalac

Durchschnittliche Zusammensetzung/ Hranilna vrednost

	100 g	100 mL	%NRV /PDV
Energie/	kJ	1990	269 /
Energijska vrednost	kcal	474	64 /
Fett/Maščobe	g	19	2,6 /
- davon gesättigte Fettsäuren/			
od tega nasičene maščobe	g	7,6	1 /
- Linolsäure/Linolna kislina	g	4,4	0,6 /
- Alpha-Linolensäure/			
alfa-linolenska kislina	mg	530	72 /
Kohlenhydrate/Ogljikovi hidrati	g	64,4	8,7 /
- davon Zucker/od tega sladkorji	g	38,2	5,2 /
Eiweiß/Beljakovine	g	11	1,5 /
Salz/Sol	g	0,325	0,04 /
Vitamine/Vitamini			
Vitamin A	µg	540	73 18
Vitamin D	µg	8,5	1,1 16
Vitamin E	mg	4	0,5
Vitamin K	µg	30	4,1 34
Vitamin C	mg	60	8,1 18
Thiamin/Tiamin	mg	0,6	0,08 16
Riboflavin	mg	1	0,14 20
Niacin	mg	6	0,8
Vitamin B6	mg	0,7	0,09
Folsäure/Folna kislina	µg	120	16 21
Vitamin B12	µg	2	0,3 38
Biotin	µg	20	2,7 27
Pantothensäure/Pantotenska kislina	mg	2,5	0,3
Mineralstoffe/Minerali			
Kalzium/Kalcij	mg	650	88 16
Phosphor/Fosfor	mg	385	52
Magnesium/Magnezij	mg	45	6,1
Eisen/Železo	mg	9,5	1,3 16
Zink/Cink	mg	4	0,5
Kupfer/Baker	mg	0,35	0,05
Mangan	mg	0,035	0,005
Jod	µg	100	14 18

*%NRV/PDV (nutrient reference values/priporočeni dnevni vnosi)

Teilweise **Magermilch**, Maltodextrin, **Laktose**, pflanzliche Öle (Palm, Soja, Kokosnuss, Raps), Fructose, Traubenzucker, Tricalciumcitrat, Tricalciumphosphat, Vitamine (Ascorbinsäure (Vitamin C), Nicotinamid (Niacin), DL-α-tocopherolacetat (Vitamin E), Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Retinylacetat (Vitamin A), Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Folsäure, D-Biotin, Phytomenadion (Vitamin K), Cholecalciferol (Vitamin D), Cyanocobalamin (Vitamin B12)), Ethylvanillin, Eisensulfat, Magnesiumoxid, Zinksulfat, Antioxidationsmittel (stark tocopherolhaltige Extrakte), Kupfersulfat, Kaliumjodid, Mangansulfat./ Delno posneto **mleko**, maltodekstrin, **laktaza**, rastlinska olja (palmovo, sojino, kokosovo, repično), fruktoza, dekstroza, trikalcijev citrat, trikalcijev fosfat, vitamini [Askorbinska kislina (vitamin C), nikotinamid (niacin), DL-alfa-tokoferil acetat (vitamin E), kalcijev D-pantotemat, riboflavin, tiaminijev hidroklorid, retinilacetat (vitamin A), piridoksinijev hidroklorid (vitamin B6), folna kislina, D-biotin, fitomenadion (vitamin K), holekalciferol (vitamin D), cianokobalmin (vitamin B12)], etil vanilin, železov sulfat, magnezijev oksid, cinkov sulfat, antioksidanti (ekstrakt bogat s tokoferoli), bakrov sulfat, kalijev jodid, manganov sulfat.

Zubereitung/Navodila za pripravo



VOR DER ZUBEREITUNG GRÜNDLICH HÄNDE WASCHEN. / PRED VSAKO PRIPRAVO OBROKA SI UMIJTE ROKE.



1 Flasche und Schnuller reinigen und 5 Minuten lang in kochendem Wasser sterilisieren. / Stekleničko in pokrovček z dudo prekuhajte v vodi. Vre naj vsaj 5 minut.



2 Frisches Leitungswasser 5 Minuten lang abkochen. / Vodo za pripravo obroka zavrite. Vre naj vsaj 5 minut.



3 Wasser auf 40 °C abkühlen und in die Flasche eingießen. / Vodo ohladite na 40 °C in jo prelijte v stekleničko.



4 Die erforderliche Anzahl an Messlöffeln hinzufügen. / S priloženo merico vsajete predpisano število meric.



5 Babyflasche mit Kunststoffdeckel schließen und schütteln, bis das Pulver im Wasser vollständig aufgelöst ist. / Stekleničko zaprite in dobro pretresite, da se prašek popolnoma raztopi.



6 Temperatur (37 °C) an der Innenseite des Handgelenks überprüfen. / Pripravljen obrok ohladite do mlačnega (37 °C), oz. dokler na koži ne čutite ne toplo ne hladno.

Novalac 3 kann als Zugabe zur Zubereitung von Milchmahlzeiten verwendet werden. / Novalac 3 se lahko uporabi kot dodatek za pripravo mlečnih obrokov.